

Fiche technique pour l'utilisation des cagettes Scalvinni

Par Julien Jeuniaux (Bee&You)

Période de mise en cage: Du 7 au 14 juillet dans nos régions.

Personnellement, je conseil de le faire au plus tôt durant cette période.

La miellée diminue le nombre d'abeilles dans la ruche et donc facilite la recherche de la reine. L'encagement n'a pas d'influence sur la miellée.

Durée d'encagement : 22 à 25 jours.


Traitement: 1er traitement: lors de la libération de la reine.
Acide Oxalique en dégouttement ou sublimation

2 ème traitement: J+4 ou J+5 après libération de la reine.
Acide Oxalique en dégouttement ou sublimation

Une application par dégouttement en premier traitement et par sublimation en second traitement ou le 1er et le second traitement en sublimation, permettent de limiter le double dégouttement qui peut être moins bien supporté par la colonie.

La cage doit être installée au centre, en haut d'un cadre, à placer au centre de la colonie en tenant compte d'un déplacement éventuel de la grappe.

Pour placer la cagette, il faut soit découper la cire à l'emplacement voulu ou simplement l'enfoncer dans la cire.



Rappel:

- Le blocage de ponte est une méthode très efficace contre le varroa, 96% d'efficacité en moyenne.
- Plus besoin de méthode « chimique »!
- La reine n'arrête pas sa ponte.
- Une reine marquée facilite l'opération!